

Soğuk Algınlığı, Mevsimsel Grip ve Domuz Gribi Belirtileri Arasındaki Farklar

BELİRTİLER	SOĞUK ALGINLIĞI	MEVSİMSSEL GRİP	DOMUZ GRİBİ
ATEŞ	Çok nadir görülür.	Genellikle görülür.	Sıklıkla rastlanır. Domuz gribine yakalananların yüzde 80'inde 38.3 derece ateş görülür.
ÖKSÜRÜK	Kesik ve balgamlı öksürük olarak görülür.	Kuru ve kesik öksürük belirtilerinden biridir.	Kesinlikle balgamsız ve halk arasında kuru öksürük olarak bilinen şekilde görülür.
AĞRI	Hafif vücut ağrıları görülebilir.	Ora dereceli vücut ağrısı olarak görülür.	Ciddi boyutlarda acı verici vücut ağrısı domuz gribinde yaygındır.
BURUN AKINTISI	Kendi kendine geçecek bir haftalık burun akıntısına rastlanır.	Yaygın bir belirtidir.	Domuz gribinde çok az görülür.
SITMA	Soğuk algınlığında sık rastlanır bir belirti değildir.	Hafif ve orta dereceli bir sıtma görülebilir.	Domuz gribine yakalananların yüzde 60'ında sıtmalanma görülmüştür.
HALSİZLİK	Hafif derecede halsizlik görülebilir.	Yaygın ve orta dereceli halsizlik görülür.	Ciddi derecede halsizlik görülür.
HAPŞIRMA	Yaygın görülen bir belirtidir.	Sıklıkla görülür.	Domuz gribinde sık görülmez.
ANİ SEMPTOMLAR	Bir-iki gün arasında belirtiler görülür.	Bir-iki gün içinde yüzde kızarıklık, iştah kaybı, baş dönmesi ve kusma gibi görülen belirtiler 4 ila 7 gün sürebilir. İshal de yaygın olarak görülür.	Domuz gribinin belirtileri 3 ila 6 saat arasında hızlı bir şekilde gelişir. Yüksek ateş, ağrı ve sızı gibi görülen belirtilerin süresi hastaya göre 4 ila 7 gün arasında değişebilir. İshal de yaygın olarak görülür.
BAŞ AĞRISI	Sık rastlanmaz.	Yaygın olarak görülür.	Domuz gribinde sık olarak görülmez.
BOĞAZ AĞRISI	Sık olarak görülür.	Genelde rastlanır.	Domuz gribinde sık olarak görülmez.
NEFES DARLIĞI	Hafif bir şekilde görülebilir.	Ora dereceli nefes darlığı görülebilir.	Acı verecek şekilde görülür.